

# DJ PACSONWEB

**POPLIMONT,NICOLAS FREDERIC (°20/01/1980)**

: IRM GENOU  
: 11/07/2025 19:04  
:



<https://imagerie.hopitalerasme.be>

Dr. LUMEN EDDY

Grand'rue 37  
7860 LESSINES

CONCERNE: POPLIMONT, NICOLAS FREDERIC (800120MP02)  
Examens réalisés: IRM GENOU le 11.07.2025 à 19.15.  
N° Passage: 41698766

Cher Confrère,

Vous trouverez ci-dessous le rapport de l'examen radiologique repris en rubrique.

Les images et le rapport sont disponibles sur <http://imagerie.hopitalerasme.be> dans la rubrique "Je suis Médecin". Connectez-vous avec votre compte, créez le si nécessaire, puis recherchez en utilisant le numéro de référence de l'examen : NA84169876618 ou un autre champ proposé.

Les images uniquement sont accessibles sur <http://imagerie.hopitalerasme.be> dans la rubrique "Je suis un Patient". Introduisez la date de naissance du patient et le numéro de référence de l'examen : NA84169876618.

IRM GENOU GAUCHE :  
Renseignements Cliniques:  
Bilan de chondropathie

Technique:  
Séquences pondérées T1-T2 FAT SAT dans le plan sagittal axial coronal, séquences pondérées T1 dans le plan sagittal

Compte Rendu:  
- Épanchement articulaire significatif.  
- Lame d'épanchement au niveau du récessus poplité.  
- Pas de fragment ostéochondral libre

Au niveau du compartiment fémoro-tibial interne:

- Clivage longitudinale communiquant de la corne postérieure du ménisque se prolongeant au niveau du segment moyen, amputation du bord libre du ménisque médial
- Pas d'anomalie du cartilage fémoro-tibiale
- Épaississement cicatriciel du ligament collatéral médial
- Pas d'anomalie des tendons de la patte d'oie.

Au niveau du compartiment fémoro-tibial externe.

- Pas d'anomalie du ménisque externe.
- Chondropathie focale bifocale à haut grade de 5 mm avec plage d'oedème sous-chondrale du plateau tibial
- Pas d'anomalie de l'angle postéro-externe.

Au niveau du compartiment fémoro-patellaire:

- Large défaut chondrale de haut 15 mm patellaire latéral associe une plage d'oedème supra-centimétrique.
- Dysplasie trochléenne.
- Infiltration de la graisse de Hoffa en sous patellaire.
- Pas d'argument pour une patella alta.
- Tendinose chronique infra patellaire
- Lame d'épanchement au niveau de la bourse pré-tibiale

Au niveau du pivot central:

- Pas d'anomalie des ligaments croisés.

#### CONCLUSION

- 1/épanchement articulaire, épanchement au niveau du récessus poplité.
- 2/chondropathie bifocale à haut grade plateau tibial latérale.
- 3/clivage méniscal médial.
- 4/large défaut ostéochondral patellaire latéral avec plage d'oedème spongieux étendue, infiltration de la graisse de Hoffa en sous patellaire.
- 5/tendinose chronique infra patellaire, lame d'épanchement au niveau de la bourse pré-tibiale

En vous remerciant de nous avoir adressé votre patient(e), nous vous prions d'agréer, Cher Confrère, l'expression de notre considération la plus distinguée.

Dr SATTARI Azadeh

Compte rendu approuvé par le Dr SATTARI Azadeh